

## 神経学的検査チャート

年月日時分

患者氏名

患者ID

患者性別 男女 年齢


- 1) 意識・精神 a) 意識 : 清明、異常 ( )  
状態 \* Japan Coma Scale (1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300)  
\* Glasgow Coma Scale (E 1, 2, 3, 4, V 1, 2, 3, 4, 5, M 1, 2, 3, 4, 5, 6 total )
- b) 検査への協力 : 協力的、非協力的
- c) けいれん : なし、あり( )
- d) 見当識 : 正常、障害 (時間、場所、人)
- e) 記憶 : 正常、障害( )
- f) 数字の逆唱 : 286、3529
- g) 計算 :  $100 - 7 =$        $93 - 7 =$        $86 - 7 =$
- h) 失行 ( )、失認 ( )
- 2) 言語 正常、失語( )、構音障害( )、嗄声、開鼻声
- 3) 利き手 右、左
- 4) 脳神経

	右	左
視力	正、低下	正、低下
視野	正、	正、
眼底	正常、動脈硬化( )度、出血、白斑、うつ血乳頭、視神経萎縮	
眼裂	> = <	
眼瞼下垂	(-) (+)	(-) (+)
眼球位置	正、斜視( )、偏視( )、突出( )	
眼球運動	上直筋 外直筋 下直筋 下斜筋 上斜筋	下斜筋 内直筋 上斜筋 下直筋 上直筋 外直筋
眼振		
複視	(-) (+) : 方向( )	
瞳孔 大きさ	(正、縮、散) mm > = < mm (正、縮、散)	
形	正円、不正	正円、不正
対光反射	速、鈍、消失	速、鈍、消失
輻湊反射	正常、障害	
角膜反射	正常、障害	正常、障害
顔面感覚	正常、障害	正常、障害
上部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
下部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
聴力	正常、低下	正常、低下
めまい	(-) (+) : 回転性・非回転性( )	
耳鳴り	(-) (+)	(-) (+)
軟口蓋	正常、麻痺	正常、麻痺
咽頭反射	(+) (-)	(+) (-)
嚥下	正常、障害( )	
胸鎖乳突筋	正常、麻痺	正常、麻痺
上部僧帽筋	正常、麻痺	正常、麻痺
舌偏倚	(-) (+) : 偏倚(右 左)	
舌萎縮	(-) (+)	(-) (+)
舌線維束性収縮	(-) (+)	

5) 運動系	a) 筋トーヌス	上肢(右・左、正常 下肢(右・左、正常	痙縮 痙縮	強剛 強剛	低下)	その他( )
	b) 筋萎縮	(-) (+)	: 部位( )			)
	c) 線維束性収縮	(-) (+)	: 部位( )			)
	d) 関節	変形、拘縮	: 部位( )			)
	e) 不随意運動	(-) (+)	: 部位( )、性質( )			)
	f) 無動・運動緩慢	(-) (+)				)
	g) 筋力	正常、麻痺	: 部位( )、程度( )			)

		右	左		右	左
頸部屈曲	C1~6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	上肢バレー	(-) (+)	(-) (+)
伸展	C1~T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	(下肢バレー)	(-) (+)	(-) (+)
三角筋	C5,6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	Mingazzini	(-) (+)	(-) (+)
上腕二頭筋	C5,6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	握力	kg	kg
上腕三頭筋	C6~8	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
手関節背屈	C6~8	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
掌屈	C6~8,T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
母指対立筋	C8,T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
腸腰筋	L1~4	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
大腿四頭筋	L2~4	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
大腿屈筋群	L4,5,S1,2	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
前脛骨筋	L4,5	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
下腿三頭筋	S1,2	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			

6) 感覚系	a) 触覚	正常、障害 : 部位( )
	b) 痛覚	正常、障害 : 部位( )
	c) 温度覚	正常、障害 : 部位( )
	d) 振動覚	正常、障害 : 部位( )
	e) 位置覚	正常、障害 : 部位( )
	f) 異常感覚・神経痛	(-) (+) : 部位( )




#### 7) 反射

	右	左	右	左	右	左
ホフマン	(-) (+)	(-) (+)	バビンスキ	(-) (+)	(-) (+)	(-) (+)
トレムナー	(-) (+)	(-) (+)	チャドック	(-) (+)	(-) (+)	(-) (+)
(腹壁) 上			(膝クローヌス)	(-) (+)	(-) (+)	(-) (+)
下			足クローヌス	(-) (+)	(-) (+)	(-) (+)

#### 8) 協調運動

	右	左
指一鼻一指	正常、拙劣	正常、拙劣
かかと一膝	正常、拙劣	正常、拙劣
反復拮抗運動	正常、拙劣	正常、拙劣

- 9) 髄膜刺激徵候 頸部硬直 (-) (+)、ケルニッヒ徵候 (-) (+)  
 10) 脊柱 正常、異常( )、ラゼーク徵候 (-) (+)  
 11) 姿勢 正常、異常( )  
 12) 自律神經 排尿機能 正常、異常( )  
                  排便機能 正常、異常( )  
                  起立性低血圧 (-) (+)  
 13) 起立、歩行 ロンベルク試験 正常、異常、マン試験 正常、異常  
                  歩行 正常、異常( )  
                  つぎ足歩行(可能・不可能)、しゃがみ立ち(可能・不可能)



## 神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師

署名

---